ÇOCUK-2 KLİNİĞİ KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA KURALLARI

İLAÇ İSMİ	SULANDIRILMASI	SEYRELTİLMESİ	SAKLANMASI	DİKKAT EDİLECEKLER
ENDOXAN (SİKLOFOSFAMİD)	500MG/25CC 1000 MG/50CC	‹10CC 10CC SF ›10CC 250 CC SF	SULANDIRILMIŞ ÇÖZELTİ 2-8 ° C DE 24 SAAT	İDRAR DANSİTESİ 101 ALTINDA OLACAK,HEMATÜRİYE DİKKAT
HALOXAN (İFOSFOMİD)	500 MG/13CC 1000MG/25CC 2000MG/50CC	‹10CC 10CC SF ›10CC 250 CC SF	SULANDIRILMIŞ ÇÖZELTİ 2-8 ° C DE 24 SAAT	İDRAR DANSİTESİ 101 ALTINDA OLACAK,HEMATÜRİYE DİKKAT
MESNA (ÜREMİTEXAN)	400MG/4CC	PUŞE YADA YÜKSEK DOZLARDA İNFÜZYON VERİLİR		SİKLOFOSFOMİD VE İFOSFAMİD VERİLDİĞİNDE MUTLAKA YAPILACAK İNF. ESNASINDA IŞIKTAN KORUNACAK
ADRİAMİSİN(DOXORUBİCİN)	10MG/5CC	100CC S	SULANDIRILMIŞ ÇÖZELTİ 2-8 ° C DE 24 SAAT 25° C YE KADAR 24 SAAT	ÖNCESİNDE EKG,İNF.SIRASINDA MONİTÖRİZE EDİLECEK,TAŞİKARDİ BRADİKARDİ AÇISINDAN DİKKAT IŞIKTAN KORUNACAK
KORABİN-CYU ALEXAN (SİTARABİN)	40MG/2CC 1000MG/20CC	100CC SF	ALEXAN FLK VE KORABİN SEYRELTİLMİŞ ÇÖZELTİ; 2-8 ° C DE 24 SAAT 25° C YE KADAR 12 SAAT	UZUN İNF. 8 SAATTE BİR İLAÇ DEĞİŞTİRİLECEK.YÜKSEK DOZ İNF.LARDA GÖZ DAMLASI VE APİKOBAL BAŞLANACAK
DAUNOMİSİN (DAUNORUBİCİN)	20MG/10CC	100CC SF	SEYRELTİLMİŞ ÇÖZELTİ; 2-8 ° C DE 24 SAAT	ÖNCESİNDE EKG,İNF.SIRASINDA MONİTÖRİZE EDİLECEK,TAİKARDİ BRADİKARDİ AÇISINDAN DİKKAT IŞIKTAN KORUNACAK
LEUNASE (L-ASPARAGİNAZ)	1.000 Ü/5CC	250CC SF 2 SAATLİK İNF.	BİLGİ YOK TEK KULLANIMLIK ?	FİBRONOJEN KONTROLÜ, 8 SAAT ÖNCESİNDE TDP VERİLECEK,ALLERJİK REAKSİYONA DİKKAT
VİNCRİSTİN (VİNCRİSTİN SÜLFAT)	1 MG/1CC 2MG/2CC	20CC SF 15 DK'LIK İNF.	TEK KULLANIMLIKTIR.	
VİNCO (VİNBLASTİN)	1MG/1CC	100CC SF	2-8 ° C DE BUZDOLABINDA SAKLANMALI	IŞIKTAN KORUNUYOR
ETOCİD (ETOPOSİD)	50MG/2.5CC 100MG/5CC	250CC SF	TEK KULLANIMLIKTIR.	IŞIKTAN KORUNUYOR HİPOTANSİYON AÇISINDAN DİKKAT EDİLECEK
DAKARBAZ (DAKARBAZİN)	200MG/20CC	100CC SF	SEYRELTİLMİŞ ÇÖZELTİ; 2-8 ° C DE 24 SAAT 25° C YE KADAR 8 SAAT	IŞIKTAN KORUNACAK
EVORABİN (CLOFARABİNE)	1 MG/1CC	250CC SF	FLK/SEYRELTİLMİŞ ÇÖZELTİ; 2-8 ° C DE 24 SAAT	2 SAATLİK İNFÜZYON
METHOTREXATE IŞIKTAN KORUNUYOR	5GR/500MG 50MG/5CC	SADECE İLAÇ VE HİDRASYON MAYİSİ	TEK KULLANIMLIKTIR İDRAR PH 7.5 ÜZERİ OLACAK	42. 48. 54. SAATLERDE MUTLAKA LEUCOVARİN YAPILIYOR
TEKAN L (TOPOTEKAN HCL)	4MG/4CC	10CC SF	FLK;TEK KULLANIMLIKTIR SULANDIRILMIŞ ÇÖZELTİ; 25° C YE KADAR 24 SAAT	IŞIKTAN KORUNUYOR

İDAMEN İDARUB(İDARUBİSİN HCL)	10MG/10CC		FLK/SEYRELTİLMİŞ ÇÖZELTİ; 2-8 ^{o} C DE 24 SAAT 25^{o} C YE KADAR 24 SAAT	IŞIKTAN KORUNUYOR
MİTOXANTRON (MİTOKSANTRON)	20MG/1CC	100CC SF	FLK; 25^{o} C YE KADAR 7 GÜN SEYRELTİLMİŞ ÇÖZELTİ; 2-8 ^{o} C DE 14 GÜN	IŞIKTAN KORUNUYOR
CARBOPLATİN (CARBOPLATİN)	450MG/45CC 50MG/15MG		FLK; 2-8 ^{o} C DE 24 SAAT	IŞIKTAN KORUNUYOR
CİSPLATİN(CİSPLATİN)	50MG/50CC 25MG/50CC	250CC SF	FLK;DERECE YOK TEK KULLANIMLIKTIR	IŞIKTAN KORUNUYOR
GEMSİTABİN(GEMCO)	100MG/25CC	100CC SF	SULANDIRILMIŞ ÇÖZELTİ; 25^{o} C YE KADAR 24 SAAT	IŞIKTAN KORUNUYOR
İRİNOCAM	300MG/15CC	250CC SF	FLK/SEYRELTİLMİŞ ÇÖZELTİ; 2-8 ^{o} C DE 24 SAAT 25^{o} C YE KADAR 12 SAAT	IŞIKTAN KORUNUYOR %5 DEX. İLE SEYRELTİLİP BUZDOLABINDA SAKLANMALIDIR
ALTUZAN	10/4MG ÇÖZELTİ		SEYRELTİLMİŞ ÇÖZELTİ 2-8 ^{o} C DE 24 SAAT	