MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

ANKSİYOLİTİK İLAÇLAR AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Anksiyolitik grubu ilaçlar, çocuk ve gençlerde, anksiyete (bunaltı, kaygı) bozukluklarında, anksiyete belirtilerinin kısa süreli tedavisinde, uyku bozukluklarında, alkol ve madde yoksunluğunun akut tedavisinde, duygudurum bozuklukları ve psikotik bozuklukların tedavisinde diğer ilaçlar ile birlikte, ajitasyon durumlarında ve antipsikotik ilaçların yan etkilerinin tedavisinde kullanılabilmektedir.

Bu grupta yer alan ilaçlar aşağıda belirtilmektedir;

- Klonazepam
- Diazepam
- Alprazolam
- Lorazepam
- Midazolam
- Buspiron
- Hidroksizin
- Difenhidramin
- Zopiklon

Bu ilaçların hepsi beyin ve sinir sisteminde etkilerini gösterirler. Sinir sisteminde iletimi sağlayan maddelerin (GABA, serotonin vb.) düzeylerini yeniden düzenleyerek hastanın var olan belirtilerinin düzelmesine olanak sağlarlar. Bazı hastalarda, çok nadir de olsa, ilaçlarını istenen etkileri yanında istenmeyen yan etkileri de ortaya çıkabilmektedir. Bu gruptaki ilaçlar ile görülebilecek yan etkiler:

- Nörolojik sistem: gün içi uyku hali ya da uykusuzluk, halsizlik, yorgunluk, sinirlilik, bilişsel işlevlerde (öğrenme üzerine) etkilenme, motor koordinasyonda azalma, dengesiz yürüme, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, kulak çınlaması.
- Gastrointestinal sistem: bulantı, kusma, mide ağrısı, kabızlık, ishal
- Antikolinerjik yan etkiler: ağız kuruluğu, öksürük, idrar yapmada güçlük
- Tersine (paradoks) etkiler: saldırganlık, anksiyete de artış, sinirlilik, çevreye ve başkalarına zarar verme, öfke nöbetleri, halüsinasyonlar, uykusuzluk, kabuslar
- Çekilme belirtileri (ilacın kesilmesi sırasında görülebilir): uykusuzluk, titreme, terleme, ağız kuruluğu, çarpıntı, anksiyete, depresyon, duyusal algı da değişme (metalik tat, tuhaf kokular), nadiren nöbetler ve paranoid düşünceler.
- Yüksek dozlarda: nöbetler, halüsinasyon, koordinasyon bozukluğu, dengesiz yürüme, göz bebeklerinde büyüme, çarpıntı, ileri aşamada koma ve ölüm

Hastamın psikiyatrik sorunun tedavisinin ilaç kullanılarak yapılmasının tıbbi yönden gerekli olduğu, tıbbi ya da yasal engel olmadıkça hastamın tedavisinde değişiklik isteyebileceğim, bu tedaviyi kabul etmezsem hastalığının kötüleşebileceği, tedavi süresinin uzayabileceği, kendisi ve çevresi için tehlikeli olabileceği bana anlatıldı. Bu ilaçlarla birlikte ek ilaç kullanılması gereken durumlarda doktora danışmam gerektiği belirtildi.

Yukarıda ilaçlarla ilgili tüm bilgileri okudum ve anladım. Gerekli gördüğüm yerlerde doktorum sözel açıklamalarda bulundu. Her ilaç için beklenmeyen yan etkilerin görülebileceği konusunda bilgilendirildim. Çocuğumun ruhsal bozukluğunun tedavisi amacıyla yukarıda bahsi geçen ilaçları kullanmasını serbest irademle kabul ediyorum.

Hastanin Adı Soyadı :
Hastane Protokol no :
Tarih :
Hastanın Vasisi :
Yakınlık Derecesi :
İmza :

Klinik Sorumlu Hekim :
Adı Soyadı :
İmza :