ANTİPSİKOTİK İLAÇLAR AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Antipsikotik grubu ilaçlar birçok çocuk ve gençlerde erken başlangıçlı şizofreni, diğer psikotik bozukluklar, duygudurum bozuklukları, otistik bozukluk, tik bozuklukları, davranış bozuklukları, dürtü denetim bozukluğunun tedavisi amacıyla kullanılabilmektedir.

Bu grupta yer alan ilaçlar aşağıda belirtilmektedir;

- Haloperidol
- Klorpromazin
- Zuklopentiksol
- Flupentiksol
- Klozapin
- Olanzapin
- Risperidon
- Ketiapin
- Amisülprid
- Ziprasidon
- Aripiprazol
- Lurasidon
- Brekspiprazol

Bu ilaçların hepsi beyin ve sinir sisteminde etkilerini gösterirler. Sinir sisteminde iletimi sağlayan maddelerin (Dopamin, serotonin ve noradrenalin gibi) düzeylerini yeniden düzenleyerek hastanın var olan belirtilerin düzelmesine olanak sağlarlar. Bazı hastalarda, çok nadir de olsa, ilaçların istenen etkileri yanında istenmeyen yan etkileri de ortaya çıkabilmektedir. Bu gruptaki ilaçlarla görülebilecek yan etkiler;

- Dolaşım sistemi: Kalp atış hızında artma, 1. Derece AV blok, QT uzamasına bağlı aritmi
- Nörolojik sistem: Vücudun değişik yerlerindeki kaslarda ağrılı kasılmalar, çift görme, ellerde titreme, yutma güçlüğü, istemsiz yüz hareketleri (geçici ya da kalıcı), motor huzursuzluk, küçük adımlarla yürüme, nöbetler, uyku hali, ağız salgısının artışı, idrar kaçırma, konsantrasyon bozukluğu, yönelim bozukluğu, bellek bozukluğu, saldırganlık, nöroleptik malign sendrom (ilaca bağlı yüksek ateş ve yönelim bozukluğu ile seyreden çok ender görülen bir klinik tablo)
- Otonom sinir sistemi: Ağız kuruması, görme bulanıklığı, göz kuruması, kabızlık, idrar yapmada güçlük, göz içi basıncında artma, cinsel istekte azalma
- Sindirim sistemi: İştah artışı ya da iştahsızlık, midede yanma hissi, bazen ishal, öğürme refleksinin kaybı, kusma, kilo alımı, karaciğer enzimlerinde yükselme, kan yağı düzeylerinde artış, sarılık
- Hormonal sistem: Prolaktin hormonunun yükselmesine bağlı adet görmeme, memeden süt gelmesi, meme büyümesi, kan şekerinde yükselme, şeker hastalığı riski, cinsel istekte azalma
- Deri üzerine etkileri: Alerjik reaksiyonlar, ürtiker, astım, ödem, döküntüler, deri renginde değişiklikler
- Kan hücreleri üzerine etkileri: Akyuvarlarda azalma, kansızlık, kemik iliği hücre yapımının baskılanması

Hastanın psikiyatrik sorunun tedavisinin ilaç kullanılarak yapılmasının tıbbi yönden gerekli olduğu, tıbbi ya da yasal engel olmadıkça hastanın tedavisinde değişiklik isteyebileceğim, bu tedaviyi kabul etmezsem hastalığının kötüleşebileceği, tedavi süresinin uzayabileceği, kendisi ve çevresi için tehlikeli olabileceği bana anlatıldı. Bu ilaçlarla birlikte ek ilaç kullanılması gereken durumlarda doktora danışmam gerektiği belirtildi.

Yukarıda ilaçlarla ilgili tüm bilgileri okudum ve anladım. Gerekli gördüğüm yerlerde doktorum sözel açıklamalarda bulundu. Her ilaç için beklenmeyen yan etkilerin görülebileceği konusunda bilgilendirildim. Çocuğumun ruhsal bozukluğunun tedavisi amacıyla yukarıda bahsi geçen ilaçları kullanmasını serbest irademle kabul ediyorum.

Hastanin Adı Soyadı	:	Klinik Sorumlu Hekim	:
Hastane Protokol no	:	Adı Soyadı	:
Tarih	:	İmza	:
Hastanın Vasisi	:		
Yakınlık Derecesi	:		
İmza	:		