

KHD.FR.21

25.12.2017

Revizyon No

Revizyon tarihi

1/1

- 1- Lekelenme şeklinde kanama olabilir ve bir süre devam edebilir
- 2- Ağrı kesici olarak doktorunuzun taburcu olurken verdiği ilaçları kullanabilirsiniz.Kan ilacı reçete edilmişse kontrole gelinceye dek ilaca devam ediniz.
- 3- Dilediğiniz her şeyi yiyip içebilirsiniz.Ancak sizde gaz yaptığını bildiğiniz yiyecekleri yemekten kaçınınız.
- 4- Dikişlerinizin alınması gerekmemektedir. Dikişler kendiliğinden eriyecek/düşecektir.
- 5- Taburcu olduktan 7 gün sonra ayakta duş şeklinde banyo yapabilirsiniz.
- 6- Genital hijyene önem verilmelidir.
- 7- Ortalama 2hafta sonra polikliniğimize kontrole başvurunuz.
- 8- Ne zaman endişelenmelisiniz?
 - Fazla miktarda olan kanama(Özellikle pembe renkli)
 - 38 derecenin üzerinde olan ateş
 - Doktorunuzun verdiği ağrı kesici ile geçmeyen ağrılar
 - Kötü kokulu vajinal akıntı
 - Yara yerinde ve etrafında kızarıklık, şişlik ve ağrı
 - Solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı
 - Bacaklarda kızarıklık, sıcaklık ve ağrı
- 9- İlaçlar:
 - Ağrı kesiciler:.....
 - Antibiyotik :.....