

KULLANILAN İLAÇ	TİCARİ İSMİ	ETKİLEŞİMİ OLAN BESİNLER	ÖNLEMLER
ACE İNHİBİTÖRLERİ			
KAPTOPRİL, RAMİPRİL, ENALAPRİL, FİSİNOPRİL, LİSİNOPRİL, KİNAPRİL, BENAZEPRİL, SİLAZAPRİL, PERİNDOPRİL, TRANDOLAPRİL	Kapril, Kaptopril, Enalap, Enapril, Konveril, Renitec, Vasolapril, Acerilin, Rilace, Zestril, Sinopryl, Zestoretic, Sinoretic, Acuitel, Coversyl, Preterax, Delix, Monopril, Cibacen, Cibadrex, İnhibace, Tarka, Gopten	Potasyumca zengin besinler (muz, kayısı, turuncgiller, patates)	Birlikte kullanılmamalıdır.
ANTİASİTLER			
ALUMİNYUM İÇERENLER	Kompensan, Gaviscon, Mucaine, Talcid, Dank	Portakal suyu	Aynı anda kullanılmamalı, en az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır.
ANTİBİYOTİKLER			
PENİSİLİN ORAL	Cliacil, Penos, Alfoxil, Penbak, Augmentin, Duobaktam, Ampisina, Amoklavin	Asitli besinler (turuncgiller, rafine edilmiş soslar -ketçap, mayonez, hardal- gazlı içecekler) kafein, domates, meyve suları	Birlikte kullanılmamalıdır.
ERİTROMİSİN	Erimicin, Eritro, Eritrosif, Eriyrocın	Asitli besinler (turuncgiller, rafine edilmiş soslar -ketçap, mayonez, hardal- gazlı içecekler) kafein, domates, meyve suları	Birlikte kullanılmamalıdır.
SİPROFLOKSASİN	Cifluran, Ciprasid, Cipro, Sispres, Ciproktan, Loxasid, Proxacin, Roflazin, Ürociproxin, Roxin, Sanset, Sifloks, Siprobek, Siprosan	Süt ve süt ürünleri gibi kalsiyumdan zengin besinler (pekmez, susam, fındık, fıstık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler)	Aynı anda kullanılmamalı, en az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır.
TETRASİKLİNLER	Tetra, Tetralet	Kalsiyum (süt ve süt ürünleri), demir (tüm kırmızı etler, kuru baklagiller, koyu yeşil sebzeler, domates, pekmez)	Aynı anda kullanılmamalı, en az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır.
ANTİDEPRESANLAR			
MOKLOBEMİD	Aurorix, Lobem	Tiramince zengin besinler (krem peynir dışındaki tüm peynirler, karaciğer, salam gibi fermente soslar, fermente soya fasulyesi ürünleri, bazı balıklar, çikolata, kahve, bazı bira ve şaraplar)	Birlikte kullanılmamalıdır.
ANTİENFLAMATUVAR			
SULFASALAZİN	Salazopyrin	Folik asit (ekmek, mısır gevreği, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, ıspanak, bezelye, portakal, mercimek)	Birlikte kullanılmamalıdır.

KULLANILAN İLAÇ	TİCARİ İSMİ	ETKİLEŞİMİ OLAN BESİNLER	ÖNLEMLER
ASETİLSALİSİLİK ASİT	Aspirin	C vitamini, Folik asit (ekmek, mısır gevreği, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, ıspanak, bezelye, portakal, mercimek), Demir (tüm kırmızı etler, kuru baklagiller, koyu yeşil sebzeler, domates, pekmez)	Etki azalması.
ANTİFUNGAL İLAÇLAR			
ANTİKANSER İLAÇLAR	Triflucan	Süt, yoğurt, alkol	Etki azalması.
ETOPOSİT, MERKAPTOPURİN, BUSULFAN, ESTRAMUSTİN, KEPESİTABİN, FLUOROUROSİL, TEMOZOLAMİD, HİDROKSİKARBAMİD, İMATİNİB, TRETİNOİN, TALİDOMİT, TACROLİMUS	Vepesid, Puri-nethol, Myleran, Estracyt, Xeloda, UFT, Temodal, Hydrea, Glivec, Vesanoid, Thalidomide, Prograf	Greyfurt	Aynı anda kullanılmamalı, en az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır.
ANTİKOAGÜLANLAR			
VARFAİN	Coumadin, Orfarin	1. K vitaminden zengin besinler (yeşil sebzeler, yonja, ıspanak, kurubaklagiller, balık) 2. E vitamini (yeşil yapraklı bitkiler, yağlı tohumlar, tahıl taneleri, kuru baklagiller) 3. 1 litreden fazla dondurma	1. Tüketimi sınırlandırılmalıdır. 2. Birlikte Kullanılmamalıdır. 3. Tüketimi sınırlandırılmalıdır.
ANTİKONVÜLZANLAR			
FENİTOİN, FENOBARBİTAL	Epdantoin, Epanutin	K vitaminleri (ısırgan, balık, kabak, karnabahar, karaciğer), D vitaminleri (balıkyağı, süt, tereyağ)	Tüketimi sınırlandırılmalıdır.
VALPROİK ASİT	Convulex	Karnitin (kırmızı et)	Birlikte kullanılmamalıdır.
BENZODİAZEPİNLER			
MİDAZOLAM, DİAZEPAM, ALPRAZOLAM, KLORDİAZEPOKSİT, LORAZEPAM	Dormicum, Diazem, Lizan, Nervium, Apo-Alpraz, Xanax, Libkol, Librax, Klipaks, Ativan	Greyfurt suyu	Birlikte kullanılmamalıdır.
BRONKODİLATÖRLER			
TEOFİLİN	Bronkolin, Talotren, Teobag, Teokap, Theo-dur	Çay, kahve, çikolata gibi teofilin içeren besinler	Tüketimi sınırlandırılmalıdır.
TERFENADİN		Greyfurt	Birlikte kullanılmamalıdır.
Ca KANAL LOKERLERİ			
FELODİPİNE, NİFEDİPİNE, NİMODİPİNE, NİSOLDİPİNE, NİTRENDİPİN, VERAPAMİL, AMLODİPİN, DİLTİAZEM	Plendil, Adalat, Kardilat, Nidicard, Nidilat, Nimotop, Syscor, Isoptin, Veroptin, Fibrocard, Tarka, Amiodis, Amiocard, Amiovas, Diloptin, Monovas, Nipidol, Norlopin, Norvadin, Norvasc, Vasocard, Vazkor, Altizem, Dilcor, Dilticard, Diltizem, Baypres, Nitrensin	Greyfurt suyu, meyan kökü	Birlikte kullanılmamalıdır.

KULLANILAN İLAÇ	TİCARİ İSMİ	ETKİLEŞİMİ OLAN BESİNLER	ÖNLEMLER
DEMİR PREPARATLARI			
	Ferrosanol Duodenal, Ferrum Fort, Ferplex, Maltofer, Gyno, Ferrosanol	Süt ve süt ürünleri gibi kalsiyumdan zengin besinler (pekmez, susam, fındık, fıstık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler)	Aynı anda kullanılmamalı, en az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır.
DİÜRETİKLER			
TRİAMTEREN, AMİLORİDE, SPIRONOLAKTON	Triamteril, Moduretic, Aldactazide, Aldactone	Potasyumca zengin besinler (muz, kayısı, turuncgiller, patates)	Birlikte kullanılmamalıdır.
KARDİYAK GLİKOZİTLER			
DİĞİTOKSİN	Digitoksin	Meyan Kökü	Kesinlikle kullanılmamalıdır.
KORTİZONLU İLAÇLAR			
	Dekort, Prednol, Prednisolon, Deltacortil	Tuz, şeker, süt, yoğurt, peynir	Birlikte kullanılmamalıdır.
LAKSATİFLER			
BİSAKODİL	Belkunis, Bisakol, Sekolaks	Süt	Birlikte kullanılmamalıdır.
STATİNLER			
ATORVASTATİN, SİMVASTATİN, FLUVASTATİN, PRAVASTATİN, SERIVASTATİN	Ator, Lipitor, Lipovas, Zocor, Zovatin, Lescol, Provachol, Lipobay	Greyfurt suyu	Birlikte kullanılmamalıdır.
TİROİD İLAÇLARI			
TİROİD HORMON	Levotiron, Tefor	Soya fasülyesi, şalgam, lahanası	Salgıyı inhibe eder.
VİTAMİNLER			
C VİTAMİNİ	Eser-vit, Redoxon, Vitabiol-C	Süt	Aynı anda kullanılmamalı, en az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Birimi	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim