

ÇOCUK KLİNİĞİ İLAÇ KULLANMA PROTOKOLÜ

İlaç adı	Uygulama Şekli	Oda sıcaklığında muhafaza süresi	Buzdolabında Muhafaza süresi	Geçimsiz olduğu ilaçlar
Vankomisin 1gr/20cc	60 dk IV İnfüzyon Reaksiyon durumunda 120 dk. IV İnfüzyon	8 saat	Enjeksiyonluk su,SF ile sulandırıldığında 14 gün	
Sefuroksim 750mg/6cc	IV İnfüzyon IV Puşe	5 saat	48 saat	
Seftriakson 1gr/10cc	IV yavaş puşe	24 saat	3 gün	
Klaritromisin 500mg/10cc	60 dk IV İnfüzyon (direkt uygulanmaz)	6 saat	Enjeksiyonluk su ile sulandırılır, %5 dekstroza İnfüzyon gönderilir, 48 saat	
Sefotaksim 1gr/4cc	IV yavaş puşe	24 saat	5 gün	
Ampisid 1gr/4cc	IV yavaş puşe	8 saat	48 saat	
Sefazolin 1gr/4cc	IV puşe	Sulandırıldıktan sonra bekletilmez	Sulandırıldıktan sonra bekletilmez	
Progas 40mg/10cc	IV Puşe	Sulandırıldıktan sonra bekletilmez	Sulandırıldıktan sonra bekletilmez	
Seftazidim 1gr/10cc	İV Puşe	Oda sıcaklığında bekletilmesi önerilmez	5 gün	
Meronem 1gr/20cc	IV Puşe- İnfüzyon	Sulandırıldıktan sonra bekletilmez	24 saat	
Zovirax 250mg/10cc	IV İnfüzyon 60 dk	Sulandırıldıktan sonra bekletilmez	İnfüzyon solüsyonunda 24 saat	
Ambisome 50mg/12cc	IV İnfüzyon 1-3 saat	Sulandırıldıktan sonra 24 saat	7 gün	%5 dekstroza sulandırılır. Başka hiçbir solüsyon,ilaç ve elektrolitle temas etmemelidir.
Vfend 200mg/19cc	1-3 saat İnfüzyon	Sulandırıldıktan sonra bekletilmez	24 saat	
Targocid 40mg/6cc	30dk İnfüzyon	Sulandırıldıktan sonra bekletilmez	24 saat	
Tazocin 4.5gr/20cc	IV İnfüzyon 30 dk gerekliyse daha fazla	24 saat	48 saat	